

PREVENCE ALVEOLÁRNÍ ECHINOKOKÓZY

JAK SE VYHNOUT „LIŠČÍ TASEMNICI“



PŮVODCE

Tasemnice měchožil bublinatý, lidově „liščí / borůvková tasemnice“

ONEMOCNĚNÍ

- Jde o relativně vzácné onemocnění.
- Nejčastěji postihuje játra.
- Dlouho je bez příznaků (5–15 let).
- Bez léčby může mít fatální následky.



KDE SE MŮŽU NAKAZIT

- Nakazit se lze v lese i ve městě.
- Nákaza je možná i v ČR.



JAK SE MŮŽU NAKAZIT

Pozřením okem neviditelných vajíček tasemnice:

- s kontaminovaným jídlem,
- neumytýma rukama,
- kontaktem se psem nebo kočkou, kteří se pohybují volně venku.



KDO JE ZDROJEM NÁKAZY

- Dospělá tasemnice žije ve střevě masožravců (např. lišek, vlků, psů).
- Vajíčka jsou vylučována s trusem.
- Člověk je náhodný hostitel.



JAK SE CHRÁNIT

HYGIENA



Myjte si ruce teplou vodou a mýdlem:

- před jídlem,
- po kontaktu se psem/kočkou,
- po práci na zahradě či v lese.

OVOCE/ZELENINA



Před konzumací je omyjte nebo uvařte.

DOMÁCÍ ZVÍŘATA



Pravidelně odčervujte.
V případě konzumace hlodavce domácím mazlíčkem se poraďte s veterinářem.

OSOBY V RIZIKU



- Myslivci
- Zahrádkáři, zemědělci
- Majitelé psů a koček



- Vajíčka tasemnice zničí var.
- Zmrazení vajíčka nezničí.
- Léčba je dostupná.
- Očkování neexistuje.